

23.12.2024.

**Pismo zdravstvenim radnicima o važnim mjerama u svrhu minimizacije ozbiljnih ishoda poznatog rizika od agranulocitoze uz primjenu lijekova koji sadrže metamizol**

Poštovani,

U saradnji s Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH), nosioci odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže metamizol žele Vas informisati o sljedećem:

**Sažetak**

- Pacijente koji su na terapiji metamizolom treba obavjestiti o:
  - ranim simptomima koji ukazuju na agranulocitozu, uključujući groznicu, drhtavicu, bol u grlu i bolne promjene na sluzokoži, posebno u ustima, nosu i grlu ili u genitalnoj ili analnoj regiji;
  - potrebi da budu na oprezu zbog ovih simptoma, s obzirom na to da se mogu pojaviti u bilo kom trenutku tokom liječenja, čak i ubrzo nakon prekida terapije;
  - potrebi da prekinu terapiju i odmah potraže medicinsku pomoć ako se javi ovi simptomi.
- Ako se metamizol primjenjuje zbog povišene tjelesne temperature, neki od simptoma agranulocitoze, mogu proći neprimjećeno. Pored toga, simptomi agranulocitoze mogu biti maskirani i kod pacijenata koji primaju antibiotsku terapiju.
- Ako se posumnja na agranulocitozu, treba odmah uraditi kompletну krvnu sliku (uključujući leukocitarnu formulu), a terapiju prekinuti dok se čekaju rezultati. Ako se agranulocitoza potvrđi, terapija metamizolom se ne smije ponovo uvoditi.
- Rutinsko praćenje krvne slike kod pacijenata na terapiji lijekovima koji sadrže metamizol se više ne preporučuje.
- Primjena metamizola je kontraindikovana kod pacijenata koji u anamnezi već imaju agranulocitozu izazvanu metamizolom (ili uslijed primjene drugih pirazolona/pirazolidina), kod pacijenata sa oštećenom funkcijom koštane srži ili sa bolestima hematopoeznog sistema.

**Dodatne informacije**

Metamizol je derivat pirazolona koji pripada grupi ne opioidnih analgetika, sa snažnim analgečkim, antipiretičkim i spazmolitičkim svojstvima. Indikovan je u terapiji određenih